

BROEDVOGELS VAN HET CORVERSBOS IN 2025



Jan Mooij

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Rapportnummer: 339

Broedvogels van het Corversbos in 2025



Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Subgroep Avifauna
Postbus 1028
1200BA Hilversum
broedvogels@vwggooi.nl
www.vwggooi.nl

Tekst : Jan Mooij

Copyright 2025 – Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum
Rapportnummer: 339
eISSN 2956-5984

Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Samenvatting

In het voorjaar 2025 is het Corversbos van Natuurmonumenten door leden van de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken geïnventariseerd op broedvogels en grote zoogdieren.

Volgens de normen van het BMP project van Sovon zijn territoria van 35 soorten vastgesteld als broedvogel. Er is één soort van de Rode lijst gevonden, namelijk de Zwarte Mees. Daarnaast stelden wij één soort van de Oranje lijst vast, namelijk de Kuifmees. Er zijn drie soorten zoogdieren waargenomen.



Het gebied

Het Corversbos ligt direct ten westen van Hilversum. Het ligt aan de rand van het Gooi, ten oosten van het landgoed Gooilust, waar het oorspronkelijk ook deel van heeft uitgemaakt. De Gravelandse landgoederen zijn aangelegd op gronden die eerst werden afgegraven ten behoeve van de stadsuitbreiding van Amsterdam. Het Corversbos ligt net buiten dit gebied en ligt dus hoger. Daardoor is het veel droger dan Gooilust en andere landgoederen. Er is geen open water aanwezig. Sinds 1934 is het Corversbos in het bezit van Natuurmonumenten. In de oorlogswinter 1944-1945 zijn bijna alle bomen gekapt, maar rond 1950 is het gebied opnieuw ingeplant. Verreweg de meeste bomen zijn nu dus ongeveer 75 jaar oud. Alleen in een paar beukenlanen staan nog veel oudere bomen. Jong bos is nauwelijks aanwezig. Het merendeel is loofhout, maar er zijn ook behoorlijke percelen naaldhout (grove den en Douglasspar) aanwezig.

Een deel van de westelijke helft wordt als akker gebruikt. Een boer verbouwt er mais, maar het grootste deel wordt door Natuurmonumenten ingezaaid met rogge. Hier wordt een ecologisch beheer toegepast om akkeronkruiden een kans te geven. In het zuidwesten ligt een golfbaan.. Ongeveer middenin aan de oostkant liggen enkele grasvelden die met hagen zijn

omzoomd en die door scholen uit de buurt als sportterrein gebruikt worden. Het onderzochte terrein is 93 ha groot. Voor een overzicht zie figuur 1.



Figuur 1. Overzicht van het onderzochte gebied.

Methode

Er is gebruik gemaakt van de broedvogelkarteringsmethode (BMP) van Sovon (van Dijk 2011). Deze werkt als volgt. In de loop van het broedseizoen worden verschillende bezoeken aan het telgebied gebracht, waarbij alle waargenomen broedvogels worden ingetekend op een veldkaart. Vervolgens worden de waarnemingen op afzonderlijke soortenkaarten overgezet. Aan het eind van het seizoen wordt het aantal territoria bepaald door alle waarneempunten op de soortenkaarten via per soort bepaalde regels te clusteren.

Na een eerste bezoek in februari werd het gebied elke twee weken van 23 maart t/m 29 juni geïnventariseerd. Op twee data werd een avondbezoek gebracht. Het team bestond normaal uit twee personen met minimaal één ervaren teller. In één geval werd geteld door één teller.


Waarnemingen van niet-broedvogels en zoogdieren werden apart genoteerd. Bij het waarnemen werd gebruik gemaakt van gewone veldkijkers.

Bij het noteren van de waarnemingen werd gebruik gemaakt van het programma Avimap van Sovon. Hierbij worden waarnemingen genoteerd op een tablet of smartphone. Door het gebruik van GPS is de positie van de waargenomen vogel eenvoudig in te geven. Na afloop van het bezoek worden de resultaten naar Sovon doorgeseind. Aan het eind van het seizoen worden de waarnemingen door een programma bij Sovon uitgewerkt volgens de regels van het BMP.

In tabel 1 staan de tijden van de reguliere bezoeken. Daarnaast zijn nog enkele incidentele waarnemingen van tellers die in de buurt wonen meegenomen.

Tabel 1. Data en tijden van de bezoeken

Datum	Begintijd	Eindtijd
22-03-2025	5.56	9.22
05-04-2025	6:02	9:12
10-04-2025	20.15	21.03
19-04-2025	5.57	9:06
03-05-2025	5.28	8.32
17-05-2025	5.17	7.40
31-05-2025	5:59	9.01
07-06-2025	21.40	22.55
14-06-2025	6.02	8.24
28-06-2025	6.08	8.08



Resultaten

Bij de inventarisatie zijn in totaal 363 territoria van 35 soorten vastgesteld. Dat zijn 73 territoria en twee soorten minder dan in 2019. Voor een overzicht zie tabel 2. Er zijn vergeleken met de vorige inventarisatie zes soorten verdwenen. Dat zijn We vonden eigenlijk alleen maar vogels die in bossen broeden. Er zijn wel akkers in het gebied, maar er was geen enkele aanwijzing dat daarop gebroed werd. Van de vastgestelde soorten staan er twee op de Rode Lijst van broedvogels. Dit waren de Zwarte Mees (kwetsbaar) en de Kuifmees (gevoelig).

Naast de soorten waarvan territoria werden vastgesteld werden ook andere potentiële broedvogelsoorten waargenomen. Dit waren de Sperwer, de Zwarte Specht, de Witte Kwikstaart, de Ekster, de Kauw en de Putter. Zij werden wel gezien, maar het aantal en aard van de waarnemingen waren onvoldoende om een territorium te mogen aannemen. Het gaat hier waarschijnlijk om vogels die in de omgeving gebroed hebben. Natuurlijk is niet uit te sluiten dat we soorten die er wel broedden in de juiste tijd gemist hebben.

Naast de vogels werden ook de waargenomen zoogdieren genoteerd. Het meest werd de Ree waargenomen. Bij vier tellingen werden in totaal 9 Reeën genoteerd. Verder werden bij één telling vier Hazen en bij één telling één Eekhoorn waargenomen.



Tabel 2. Aantal vastgestelde territoria

Soort	Aantal
Nijlgans	1
Havik	1
Buizerd	1
Holenduif	6
Houtduif	9
Bosuil	2
Grote Bonte Specht	12
Middelste Bonte Specht	1
Winterkoning	36
Heggenmus	2
Roodborst	45
Gekraagde Roodstaart	1
Merel	26
Zanglijster	14
Zwartkop	32
Fitis	6
Tjiftjaf	19
Grauwe Vliegenvanger	1
Bonte Vliegenvanger	3
Staartmees	1
Glanskop	5
Kuifmees	2
Zwarte Mees	2
Pimpelmees	22
Koolmees	32
Boomklever	8
Boomkruiper	18
Gaai	2
Zwarte Kraai	3
Goudhaan	6
Vuurgoudhaan	2
Vink	41
Groenling	1
Goudvink	1
Appelvink	3

Vergelijking met eerdere inventarisaties en discussie.

Het Corversbos is al sinds 1934 in bezit van Natuurmonumenten. De oudste inventarisatie gegevens in het archief van Natuurmonumenten dateren echter pas uit 1976. Daarna zijn ook gegevens aanwezig uit 1981, 1988, 1995, 2013 en 2019. Een probleem bij de interpretatie van de resultaten is de vergelijkbaarheid van de onderzoeken. De methodes verschillen, niet altijd werden alle soorten geteld en soms blijkt ook het onderzochte gebied kleiner of groter te zijn dan het nu onderzochte terrein. De resultaten van alle onderzoeken zijn te vinden in bijlage 1.

In 1976 (Nijland 1977) is een inventarisatie uitgevoerd door de NJN Hilversum. Er zijn vier bezoeken gebracht. De methode wordt verder niet gegeven het lijkt er op dat niet alle soorten zijn geteld, want de lijst omvat slechts 11 soorten. Het zou ook kunnen zijn dat een deel van de lijst ontbreekt. Het noordelijke deel van ons gebied is niet onderzocht.

In 1981 is een inventarisatie uitgevoerd voor de Provinciale Planologische Dienst Noord-Holland (van Beusekom 1981). Veel minder algemene soorten werden daarbij gekarteerd maar van de talrijke soorten werd alleen de aan- of afwezigheid genoteerd. In het verslag wordt geen methode aangegeven. Er is een groter gebied onderzocht.

De inventarisatie in 1988 (Jonkers en Vermeule 1989) werd ongeveer met dezelfde methode uitgevoerd als ons onderzoek. Het gebied werd in twee delen onderzocht waardoor de totale bezoektijd aanzienlijk langer is dan bij ons. Het valt op dat voor een aantal veel voorkomende soorten (maar niet alle) de aantallen veel hoger zijn dan bij de andere inventarisaties.

Het onderzoek in 1995 (Kwint 1995) is in principe op dezelfde manier uitgevoerd als onze inventarisatie. Een aantal algemene soorten zijn echter niet meegenomen.

De inventarisaties in 2013 en 2019 door onze werkgroep (Mooij 2013, 2019) zijn volgens dezelfde methode uitgevoerd als dit onderzoek.

In het rapport van de inventarisatie in 2019 zijn de resultaten vergeleken met alle voorgaande inventarisaties. Daarom zullen wij ons hier vooral concentreren op de ontwikkeling sinds dat jaar, al zullen hier en daar ook andere inventarisaties ter sprake komen. Vergeleken met 2019 zijn er vier soorten bij gekomen. Dit zijn Middelste Bonte Specht, Gekraagde Roodstaart, Vuurgoudhaan en Gekraagde Roodstaart. Daartegenover zijn er zes soorten verdwenen. Dit zijn Koekoek, Kerkuil, Zwarte Specht, Witte Kwikstaart, Grote Lijster en Putter. Bij de verdwenen soorten waren er in 2019 hoogstens twee territoria aanwezig. Alleen de Grote Lijster was bij bijna alle eerdere inventarisaties aanwezig. Alle andere betrokken soorten waren voor 2019 hooguit een enkele maal aangetroffen.

Alle dit jaar vastgestelde broedgevallen betreffen bosvogels of bosrandvogels. Op de akkers zijn sinds 1988 geen broedgevallen meer vastgesteld. Aangezien er geen water is kunnen watervogels alleen aan de uiterste westrand, waar een vaart loopt, voorkomen. De enige soort die we vonden was de Nijlgans, die in bomen broedt en dus als broedvogel minder aan water gebonden is.

Wij vonden twee territoria van roofvogels. De territoria van de Havik en de Buizerd zijn vaak groter dan het oppervlak van het bos, maar het lijkt er op dat in ieder geval het nest van de Havik binnen het gebied lag.

Veel wat grotere hollenbroeders zijn sinds 1988 sterk achteruit gegaan. De Holenduif lijkt weer wat terug te komen, maar de aantallen zijn nog steeds veel lager dan in de jaren tachtig terwijl het bos ouder is geworden. De Kauw en de Spreeuw ontbreken nog steeds, al zagen

wij ze wel een aantal malen rondvliegen.. De Zwarte Specht is één maal waargenomen, maar hij heeft bijna zeker buiten het gebied gebroed. De komst van de boommarter lijkt nog steeds de meest voor de hand liggende verklaring voor de schaarste aan grotere holenbroeders.


Sinds de vorige inventarisatie is het aantal vastgestelde territoria afgenomen van 440 tot 373. Deze afname treedt bij veel soorten, maar er zijn ook soorten toegenomen. Flinke afnames waren er bij Grote Bonte Specht, Merel en Pimpelmees. Voor details zie de soortbeschrijvingen. Voor de meeste soorten zijn de oorzaken van de afname ons niet duidelijk.


De broedvogel bevolking van het Corversbos lijkt in de afgelopen zes jaar niet erg veranderd te zijn. Het bos doet duidelijk saaier aan dan de Gravelandse buitenplaatsen. Voor een deel kan dat toegeschreven worden aan het gebrek aan variatie in ouderdom van het bos. Daarnaast is natuurlijk het ontbreken van water een belangrijke factor. De soortenlijst is, ook als we afzien van watervogels, wat korter dan die van Schaep en Burgh, Boekesteijn en Bantam, die we in 2021 inventariseerden (Mooij 2021). Ook is het aantal territoria per hectare in het Corversbos lager, zelfs als we de watervogels buiten beschouwing laten.


Soortbespreking

In dit hoofdstuk worden de vastgestelde broedvogels per soort beschreven.


Elke stip in de stippenkaart staat op de plaats van de eerste waarneming voor dat territorium.

Nijlgans	1 territorium
	Een aantal malen is een paartje Nijlganzen waargenomen. Dit is voldoende om een territorium vast te stellen. De Nijlgans broedt vaak in bomen, en die hoeven niet dicht bij water te staan. De laatste jaren zijn de aantallen van de Nijlgans in Nederland stabiel.



Buizerd	1 territorium
	Een aantal keren werden roepende Buizerds boven het gebied waargenomen. Bij een waarneming werd een Buizerd op een nest gezien. In 2013 en 2019 werd ook een territorium vastgesteld. Landelijk neemt de Buizerd als broedvogel matig toe.

Havik	1 territorium
	.De waarnemingen van een zingende Havik waren geconcentreerd in één stuk bos. Ook zijn daar jonge roofvogels gehoord. Het lijkt dus wel zeker dat Havik hier succesvol gebroed heeft. Landelijk zijn de aantallen broedvogels stabiel.




Holenduif	6 territoria
	.Het aantal Holenduiven neemt weer toe na een scherpe daling, die toegeschreven werd aan het verschijnen van de boommarter. De boommarter is er nog steeds, misschien hebben de Holenduiven zich op een of andere manier aangepast. Het valt op dat alle waarnemingen werden gedaan in de noordelijke helft van het gebied. Landelijk neemt de Holenduif licht toe.


Houtduif	9 territoria
	.Het aantal territoria is wat lager dan bij eerdere inventarisaties. Een oorzaak van de afname van de Houtduif is de aanwezigheid van een Havik, maar die waren er in de twee vorige inventarisaties ook. Landelijk neemt de Houtduif als broedvogel licht toe.


Bosuil	2 territoria	Dit aantal is hetzelfde als bij de vorige inventarisatie. De territoria zijn gebaseerd op avondbezoeken en waarnemingen van rustende vogels overdag. Landelijk neemt de Bosuil matig toe.
Grote Bonte Specht	12 territoria	Vergeleken met de twee vorige inventarisaties betekent dit een halvering. Interpretatie van de waarnemingen van de Grote Bonte Specht is moeilijk, maar dit suggereert toch wel een afname van de aantallen. Landelijk neemt de Grote Bonte Specht matig toe.
Middelste Bonte Specht	1 territorium	Voor het eerst is in het Corversbos bij een inventarisatie een Middelste Bonte Specht waargenomen. Het territorium is gebaseerd op twee waarnemingen. De Middelste Bonte Specht breidt zich in Nederland duidelijk uit.

Winterkoning	36 territoria
	Het aantal territoria van de Winterkoning is vrijwel gelijk aan dat bij vorige inventarisaties. De soort komt overal voor waar bos met onder begroeiing aanwezig is. Landelijk zijn de aantallen de laatste jaren stabiel.
Heggenmus	2 territoria
	De Heggenmus is in het Corversbos letterlijk een randverschijnsel. Hij is vooral een broedvogel van tuinen. Ook bij vorige inventarisaties lagen alle territoria aan de rand van het gebied. Dit is een sterke afname ten opzichte van de vorige inventarisatie in 2019. Landelijk neemt de Heggenmus af.
Roodborst	45 territoria
	Ook het aantal Roodborst territoria lijkt niet duidelijk veranderd te zijn sinds de vorige inventarisaties. Landelijk neemt de Roodborst de laatste jaren toe.


Gekraagde Roodstaart	1 territorium
	Maar één keer eerder (1981) werd een territorium van Gekraagde Roodstaart gevonden. Landelijk neemt de Gekraagde Roodstaart toe.
Merel	26 territoria
	Het aantal territoria is sinds de twee vorige inventarisaties sterk verminderd. Landelijk neemt de merel ook af. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het Usutu virus.
Zanglijster	8 territoria
	Ook de Zanglijster is duidelijk achteruit gegaan. Landelijk neemt deze soort echter toe.



Zwartkop	32 territoria
	De Zwartkop lijkt iets minder talrijk dan in de vorige inventarisatie in 2019, maar duidelijk toegenomen ten opzichte van 2013. Hij komt overal voor waar geschikt biotoop aanwezig is. Landelijk neemt Zwartkop toe.
Tjiftjaf	19 territoria
	De Tjiftjaf is wat toegenomen sinds 2019 en nu weer op het niveau van de twee inventarisaties daarvoor. Landelijk neemt de Tjiftjaf toe.
Fitis	6 territoria
	.De toename van de Fitis is verrassend groot. Het geschikte biotoop, open jonge opslag, lijkt niet te zijn toegenomen. Landelijk neemt de Fitis af.

Goudhaan	7 territoria
	De Goudhaan is op hetzelfde niveau gebleven als bij de vorige inventarisatie. Bij eerdere inventarisaties waren de aantallen duidelijk hoger. Landelijk neemt de Goudhaan af.
Vuurgoudhaan	2 territoria
	Dit is de eerste keer dat de Vuurgoudhaan in het Corversbos is vastgesteld. Landelijk neemt de Vuurgoudhaan sterk toe.
Grauwe Vliegenvanger	1 territorium
	.Alleen in 1995 is de Grauwe Vliegenvanger eerder vastgesteld in dit gebied. Landelijk is deze soort stabiel.

Bonte Vliegenvanger	3 territoria
	Bij iedere inventarisatie zijn wel Bonte Vliegenvangers gehoord. Dit jaar waren het er relatief veel. Landelijk neemt de Bonte Vliegenvanger toe.
Staartmees	1 territorium
	In vorige inventarisaties vond men steeds twee territoria. Dit aantal is te klein om nu al te mogen concluderen dat de Staartmees is afgenomen. Landelijk neemt de Staartmees af.
Glanskop	5 territoria
	.Het aantal vastgestelde Glanskop territoria ligt in de range van de vorige tellingen. Landelijk is de Glanskop stabiel.

Zwarte Mees	2 territoria
	De Zwarte Mees kwam ook bij eerdere inventarisaties al weinig voor. Landelijk neemt de Zwarte Mees af. Hij staat als kwetsbaar op de Rode Lijst.
Li	
Kuifmees	2 territoria
	De Kuifmees is ten opzichte van eerdere inventarisaties duidelijk afgenomen. Landelijk zijn de aantallen stabiel. Hij staat als gevoelig op de Rode Lijst.
Pimpelmees	22 territoria
	.De Pimpelmees is duidelijk afgenomen. Wij vonden in tegenstelling tot de vorige keer minder Pimpelmezen dan Koolmezen, wat ook de gebruikelijke situatie is. Landelijk neemt de Pimpelmees toe.

Koolmees	32 territoria
	Het aantal Koolmezen is sinds de laatste twee inventarisaties nauwelijks veranderd. Landelijk neemt de Koolmees toe.
Boomklever	8 territoria
	De Boomklever is sinds de laatste inventarisatie afgenomen. Bij eerdere inventarisaties zag men een geleidelijke toename die werd toegeschreven aan het ouder worden van het bos. Het valt op dat er in de zuidelijke helft veel minder Boomklevers zijn dan bij eerdere inventarisaties. Landelijk neemt de Boomklever toe.
Boomkruiper	18 territoria
	.De Boomkruiper is sinds de laatste inventarisatie afgenomen. Ook hier valt op dat deze afname bijna helemaal in de zuidelijke helft optreedt. Landelijk neemt de Boomkruiper toe.

Gaai	2 territoria
	Het aantal vastgestelde territoria is sterk afgenomen ten opzichte van alle vorige inventarisaties. Gaaien zijn moeilijk te inventariseren omdat zij in het broedseizoen extreem schuw zijn. Toch lijkt het er op dat de Gaai inderdaad is afgenomen. Landelijk is de Gaai stabiel.
Zwarte Kraai	3 territoria
	De Zwarte Kraai lijkt ook te zijn afgenomen. De interpretatie van waarnemingen van deze soort is erg moeilijk. Ze vliegen door het hele gebied en roepen op allerlei plekken. Landelijk is de Zwarte Kraai de laatste jaren stabiel.
Vink	41 territoria
	Het aantal Vinken is na de vorige inventarisaties niet wezenlijk veranderd. Hij komt overal voor waar bos is. Landelijk neemt de Vink de laatste jaren toe.

Groenling	1 territorium
	Wij vonden nog maar één territorium van de Groenling. Dit is minder dan bij de vorige inventarisaties. De Groenling heeft last van een infectieziekte. Ook landelijk neemt de Groenling af.
Appelvink	3 territoria
	Ten opzichte van de vorige inventarisatie lijkt de Appelvink achteruit te zijn gegaan. Wel moet worden bedacht dat zowel nu als in 2019 de meeste territoria op maar één waarneming zijn gebaseerd. Landelijk neemt de Appelvink toe.
Goudvink	1 territorium
	.Het aantal vastgestelde territoria van Goudvinken is stabiel. Net als in vorige jaren was het territorium gebaseerd op één waarneming. Landelijk neemt de Goudvink af.

Verantwoording

De tellingen zijn uitgevoerd door:

Guido Band
Ingrid Cramer
Han Dijkers
Eddy Grotendorst
Jan Mooij
Feiko Prins
Harriet Velzeboer

Contactpersoon bij Natuurmonumenten was Tim van den Broek. Hij Gaf een introductie voor het gebied en verzorgde de vergunningen.

Het rapport en de foto's werden gemaakt door Jan Mooij.

Gebruikte literatuur

Beusekom R.van 1981 Broedvogelgegevens 's-Gravelandse buitenplaatsen 1981
Van Dijk A. en A.Boele 2011 Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek Nederland, Nijmegen
Jonkers, D.A., Kole, R.A. & Taapken, J, (red.) 1987. Vogels tussen Vecht en Eem. VWG het Gooi en Omstreken, Hilversum
Jonkers D.A. en A.P.Vermeule 1989 Vogelinventarisatie Corversbosch 1988, Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken Uitgave 64 Hilversum
Kwint N.D. 1995 Broedvogels van de 's-Gravelandse Buitenplaatsen, SOVON-inventarisatie-rapport 1995/12. Beek-Ubbergen
Kwint N.D. en J.van Betteray 1996, Broedvogels 's-Gravelandse Buitenplaatsen in 1995, de Korhaan 30 (3) 66-71
Mooij J. 2013 Broedvogels Corversbos 2013, Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken Uitgave 221 Hilversum
Mooij J. 2019 Broedvogels Corversbos 2019, Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken Uitgave 284 Hilversum
Mooij J. 2021 Broedvogels Schaep en Burgh, Boekesteijn en Bantam 2021, Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken Uitgave 303 Hilversum

Bijlage 1. Resultaten inventarisaties Corversbos

+ betekent aanwezig maar aantal niet bekend.

ng betekent dat de soort niet geteld is, dus dat hij ook afwezig zou kunnen zijn.

	1977	1981	1988	1995	2013	2019	2025
Nijlgans					1	1	1
Bergeend		2					
Wilde Eend		+					
Buizerd			1	1		1	1
Sperwer		2		1			
Havik					1	2	1
Fazant	3	+					
Scholekster	1	1	1				
Kievit	3	3		3			
Houtsnip			1				
Holenduif		10	14	4		2	6
Houtduif		+	83	ng	12	12	9
Zomertortel			2				
Turkse Tortel		+					
Koekoek				1		1	
Kerkuil						1	
Bosuil		1	3	1		2	2
Groene Specht		1	2	2			
Zwarte Specht		0,5		1		1	
Grote Bonte Specht		9	16	10	23	23	12
Middelste Bonte Specht							1
Veldleeuwerik	1						
Witte Kwikstaart						3	
Winterkoning	19	+	32	ng	33	35	36
Heggenmus	2	+	1	2	3	6	2
Roodborst	19	+	87	ng	36	49	45
Gekraagde Roodstaart		1					1
Merel	31	+	95	ng	46	42	26
Grote Lijster		1	2	2	2	1	
Zanglijster		+	4	ng	13	13	8
Kleine Karekiet					1		
Tuinfluit		1		6	1		

Bijlage 1. Vervolg

	1977	1981	1988	1995	2013	2019	2025
Zwartkop	4	5	16	18	20	38	32
Fluiter					2		
Tjiftjaf	2	11	14	21	17	14	19
Fitis	8	+	1	3		2	6
Goudhaan		7	24	ng	15	6	7
Vuurgoudhaan							2
Grauwe Vliegenvanger				2			1
Bonte Vliegenvanger		1	3	1	1	1	3
Staartmees			2	2	2	2	1
Glanskop		5	6	1	6	3	5
Zwarte Mees		2	13		2	1	2
Kuifmees		10	15	8	4	6	2
Matkop		9	10	3			
Pimpelmees		+	37	ng	26	35	22
Koolmees		+	61	ng	33	32	32
Boomklever		3	7	5	11	13	8
Boomkruiper		7	15	13	24	24	18
Gaai		+	12	5	5	5	2
Ekster		3	13	5			
Kauw		+	16	3			
Zwarte kraai			13	3	5	7	3
Spreeuw		+	6	2			
Huisemus		+					
Vink		+	20	ng	42	45	41
Groenling		+		1	4	3	1
Sijs					2		
Appelvink			1	1	2	5	3
Goudvink			1		1	1	1
Kneu		+					
Putter						2	